


### Tabuľka 1 Pravidelné a nepravidelné schémy očkovania

Tabuľku je potrebné používať spoločne s textom a vysvetľvkami pod tabuľkou.



**vek pre pravidelné očkovanie**

**vek pre očkovanie pri premeškání**

**Minimálny vek očkovania**

\*\* vakcína s obsahom 20 µg HbsAg  
 \*\*\* dávka VHB sa podá, iba ak nie je dostupná kombinovaná vakcína bez VHB zložky

HBsAg pozitívna matka\* - súčasne s 1. dávkou sa podáva HBIG (hyperimúnny špecifický ľudský imunoglobulín)

d = dávka základného očkovania, p = dávka preočkovania

DTaP = vakcíny s vyšším obsahom diftériového a pertusového toxoidu

Tdap = vakcíny s nižším obsahom diftériového a pertusového toxoidu

**Tabuľka 2 Schéma očkovania pri začatí očkovania v neskoršom veku ako je určený vek**

<i>Poradie dávky a typ vakcíny</i>		<i>Minimálny interval</i>	<i>Poznámka</i>
<b><i>Dieťa vo veku 1 - 2 roky</i></b>			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/- (Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV+VHB		6 mesiacov	odporúčaný interval: 6 mesiacov bez Hib zložky
1. MMR			očkovanie od 15. mesiaca veku kedykoľvek
PCV	<u>A alternatíva</u> 1. PCV 13	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
	<u>B alternatíva</u> 1. PCV10	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
<b><i>Dieťa vo veku 3 - 4 roky</i></b>			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/- (Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV a samostatná VHB		5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
PCV	1. PCV13		
	1. PCV10		možno podať do veku 5 rokov
1. MMR			kedykoľvek
2. MMR		4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov druhá dávka v 5. roku života
<b><i>Dieťa vo veku 5 - 6 rokov</i></b>			
1. DTaP+IPV a samostatná VHB			
2. DTaP+IPV a samostatná VHB		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace

3. DTaP+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
4. DTaP+IPV	6 - 12 mesiacov	preočkovanie – 4. dávka Td
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov
<b><i>Dieťa od 7 rokov</i></b>		
1. Tdap+IPV a samostatná VHB		
2. <u>A. alternatíva:</u> Td a samostatná IPV a samostatná VHB <u>B. alternatíva:</u> Tdap+IPV a samostatná VHB	4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
3. <u>A. alternatíva:</u> Td a samostatná IPV a samostatná VHB <u>B. alternatíva:</u> Tdap+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
4. Td a samostatná IPV	6 – 12 mesiacov	najvhodnejšie v 13. roku
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov